

RICEPAL

Herbicida Agrícola

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Propanil480 g/L

3',4'-dichloropropionanilide de formulación a 20 ° C.

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. PL0003572022

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CARACTERÍSTICAS:

RICEPAL es un herbicida para uso en aplicaciones en post-emergencia temprana cuyo ingrediente activo es PROPANIL, es un Concentrado Emulsionable, selectivo al cultivo del arroz, es indicado especialmente contra malezas gramíneas anuales, ciperáceas y algunas malezas de hoja ancha. Los síntomas visibles incluyen una clorosis inicial moderada de los tejidos nuevos, seguido por una necrosis progresiva y colapso en la base de las plantas. Actúa por contacto y se degrada rápidamente en la planta y en el suelo.

Una vez el producto llega al follaje y en presencia de luz solar, se absorbe y comienza su acción herbicida sobre las malezas susceptibles, afecta los procesos fotosintéticos, inhibiendo el fotosistema II de las malezas susceptibles, se le considera un producto de contacto.

Cultivo	Malezas que controla		Dosis Litros/ha	P.C	P.R
Arroz	Nombre Común	Nombre Científico	4.0 L/ha	N.A.	0 horas
	Caminadora	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>			
	Pasto negro	<i>Steinchisma laxum</i>			
	Bledo	<i>Amaranthus dubius</i>			
	Botoncillo	<i>Eclipta alba</i>			

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado.

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo, a los 12 días de germinado el arroz cuando las malezas tengan no más de 2 a 3 hojas y nunca cuando tengan más de 8 a 10 cm de altura. Se debe realizar la aplicación de **RICEPAL** dependiendo del estado de desarrollo, del estado de las malezas y la zona agro-ecológica. Para un buen control con **RICEPAL** es necesario observar que las condiciones de humedad sean adecuadas. En siembras de riego por inundación, se recomienda drenar completamente el terreno 2 a 3 días antes de la aplicación para exponer las malezas y lograr que la aspersión entre en contacto con el follaje de las malezas. Después de aplicado en siembras de inundación, se debe regar inmediatamente para mejores resultados.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano a una presión de 40 a 50 PSI.

Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua, haciendo un triple lavado del envase. Completar el volumen con agua agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Este herbicida es compatible con la mayoría de los herbicidas e insecticidas comúnmente aplicados. No debe mezclarse con plaguicidas de reacción alcalina, o con productos organofosforados o carbamatos. Si requiere utilizar estos productos, deje un margen de 15 días, antes o después, para evitar daños y toxicidad al cultivo. Se recomienda, sin embargo, bajo responsabilidad del usuario, que en casos de mezclas de tanque con otros plaguicidas, se realice previamente una prueba de compatibilidad, observando las plantas tratadas en los tres días siguientes a la aplicación, para determinar los aspectos físicos y las reacciones a efectos fitotóxicos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: “El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

Nombre y dirección del titular del registro:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Carrera 11A # 93 A 80, Oficina 305

Teléfono: 57-1-6235967

Nombre y dirección del fabricante o formulador:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW.

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222

Fax: 86-531-88875232

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSOS

Nocivo en caso de Ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala



ATENCIÓN