



EMULSIÓN CONCENTRADA EC

Registro ICA: PL0002892024

Titular del Registro: VILLARROZ S.A.

## Ingrediente Activo

**Oxadiazon.....250 g/L**  
5-tert-butyl-3-(2, 4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3, 4-oxadiazol-2(3H)-one, formulación a 20°C.

**Ingredientes Aditivos:..... c.s.p. 1 L**

## Características

**COMANCHE® 25 EC** es un herbicida selectivo de contacto destinado al control pre-emergente y post-emergente temprano de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de arroz de riego. Se aplica sobre el suelo húmedo. Presenta absorción desde las hojas y las raíces, interviniendo en el proceso fotosintético de las malezas.

## Recomendaciones de Uso

| CULTIVO                             | MALEZAS A CONTROLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EPOCA DE APLICACIONES                                                                                                                                             | TIPO DE SUELO     | DOSIS (L/Ha) | PERIODO DE CARENIA (P.C.) | PERIODO DE REINGRESO (P.R.) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| Arroz de riego y de siembra directa | <b>Malezas gramíneas:</b><br>Liendre de puerco ( <i>Echinochloa colonum</i> )<br>Guarda rocío ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )<br>Pata de gallina ( <i>Eleusine indica</i> )<br>Paja mona ( <i>Leptochloa filiformis</i> )<br>Granadilla ( <i>Panicum fasciculatum</i> )<br>Caminadora o pela bolsillo ( <i>Rotiboeilia exaltata</i> )<br>Falsa caminadora ( <i>Ischoemum rugosum</i> )<br>Paja peluda ( <i>Paspalum pilosum</i> )                                                                                         | Pre-emergencia.<br>Aplicar entre el 1° y el 8° día después del primer moje de germinación. Si el arroz se puya, aplicar hasta con un máximo de 20% de puyamiento. | Texturas pesadas  | 4.5          | N.A.                      | 24 horas                    |
|                                     | <b>Malezas hojas anchas:</b><br>Amaní escarlata ( <i>Amaranthus coccineus</i> )<br>Bledo ( <i>Amaranthus dubius</i> )<br>Caperonía ( <i>Cyperus polystachyus</i> )<br>Pega pega ( <i>Desmodium illinoense</i> )<br>Lechecilla ( <i>Euphorbia</i> spp.)<br>Buche de gallina ( <i>Heteranthera limosa</i> )<br>Dormidera ( <i>Mimosa pudica</i> )<br>Verdolaga ( <i>Portulaca oleraceae</i> )<br>Sesbania ( <i>Sesbania exaltata</i> )<br>Botoncillo ( <i>Eclipta alba</i> )<br>Clavo de agua ( <i>Jussiaea floribunda</i> ) |                                                                                                                                                                   | Texturas livianas | 4.0          |                           |                             |





**Nota: No se puede aplicar en suelos arenosos**

**\*P.R.: Periodo de Reingreso:** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido.

**\*P.C.: Periodo de Carencia:** No aplica por método y época de aplicación

## Frecuencia y época de aplicación

En pre-emergencia aplicar entre el 1° y 8° día después del primer moje de germinación. Si el arroz se puya, aplicar hasta con un máximo de 20% de puyamiento.

Se recomienda aplicar **COMANCHE® 25 EC** sobre el suelo húmedo y bien preparado; es decir, sin terrones.

## Equipos y volumen de mezcla

**COMANCHE® 25 EC** se puede aplicar por vía aérea o terrestre. Para aplicaciones terrestres se pueden utilizar equipos convencionales, los cuales deben estar perfectamente limpios y calibrados que permitan un óptimo desempeño del producto.

Si la aplicación se realiza con equipo terrestre (bomba de espalda) se debe usar un volumen de agua de 200 litros de mezcla por hectárea. Si la aplicación es aérea, usar 15 a 20 galones de mezcla por hectárea.

### Preparación de la mezcla:

Diluir la cantidad necesaria en un poco de agua agitando bien, y completar luego esta mezcla con el resto de agua hasta obtener una emulsión uniforme. En el caso de mezclas de **COMANCHE® 25 EC** con un producto de formulación sólida, se deben hacer dos premezclas separadas con cada producto para unir las después.

## Compatibilidad y fitotoxicidad

No se recomienda mezclar **COMANCHE® 25 EC** con otros productos sin realizar previamente pruebas de compatibilidad.

No produce fitotoxicidad si se siguen las indicaciones dadas en la etiqueta. En caso de aplicarse en nuevas variedades se recomienda hacer pruebas a pequeña escala.

## Información sobre responsabilidad civil

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

## Categoría toxicológica

