



MINOTAURO[®]

250SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

Registro ICA: PL0002612023

Titular del Registro: VILLARROZ S.A.

Ingrediente Activo

Azoxystrobin..... 250 g/L
Methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate, de formulación a 20°C.

Ingredientes Aditivos:..... c.s.p. 1 L

Características

MINOTAURO® 250 SC es un fungicida de acción sistémica y de contacto de rápida penetración, preventivo y curativo utilizado para el control de una amplia gama de enfermedades fungosas. **MINOTAURO® 250 SC** proporciona una actividad preventiva duradera y acción curativa contra enfermedades como Complejo Manchado de grano en arroz y Amarillera en tomate.

Recomendaciones de Uso

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS (L/Ha)	PERIODO DE CARENCIA (P.C.)	PERIODO DE REENTRADA (P.R.)
Arroz	Complejo manchado de grano (<i>Helminthosporiumoryzae</i> , <i>Cercospora oryzae</i> , y <i>Sarocladiumoryzae</i>)	0.6	14 Días	
Tomate	Amarillera (<i>Alternaria solani</i>)	0.2	2 Días	4 horas
Gulupa	Antracnosis (<i>Colletotrichum spp.</i>)	0.16	3 Días	

* Realizar la aplicación al inicio de floración (aprox. 75-80 días después de la germinación) con 1% - 2% de espigamiento.

** Realizar la aplicación con los primeros síntomas de la enfermedad (menos del 5% de manchas de *Alternaria solani* en el caso de Tomate y menos del 5% de manchas de *Colletotrichum spp.* en el caso de Gulupa.

P.C.: PERIODO DE CARENCIA: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: PERIODO DE REENTRADA: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado





Frecuencia y época de aplicación

Antes de usar **MINOTAURO® 250 SC** lea detenidamente la etiqueta; debe ser aplicado por aspersión foliar dirigida al control de la enfermedad.

Para preparar la mezcla de aplicación llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad a aplicar según las dosis recomendadas y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua. Mantenga agitación constante de la mezcla contenida en el tanque, obteniendo durante la aplicación un cubrimiento uniforme de las plantas. Los equipos usados en la aplicación deben ser lavados cuidadosamente después de cada aplicación, por lo menos tres veces. El producto debe ser manejado dentro de un plan de Manejo Integrado de las enfermedades.

Equipos y volumen de mezcla

MINOTAURO® 250 SC debe aplicarse por vía terrestre, utilizando bombas de espalda o estacionarias siguiendo los métodos de calibración recomendados por el respectivo fabricante, utilizando la dosis recomendada por el ingeniero agrónomo de conformidad con el nivel de infección del cultivo.

Compatibilidad y fitotoxicidad

MINOTAURO® 250 SC no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad.

MINOTAURO® 250 SC no es fitotóxico a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

MINOTAURO® 250 SC no tiene ningún efecto perjudicial sobre cultivos sucesivos ni sobre otros cultivos, sin embargo, para evitar la resistencia que puedan presentar las enfermedades se debe tener en cuenta un programa especial de manejo integrado de los cultivos.

Información sobre responsabilidad civil

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

Categoría toxicológica

