



SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

Registro ICA: PL00016952023

Titular del Registro: VILLARROZ S.A.

Ingrediente Activo

Iprodione 500 g/L
3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide, formulación a 20°C.

Ingredientes Aditivos:..... c.s.p. 1 L

Características

TORIN® 500 SC Es un fungicida de contacto, con acción preventiva y curativa, que pertenece al nuevo grupo químico de las dicarboxamidas. Inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio de los hongos patógenos. Es muy persistente en el suelo y posee una alta efectividad contra botrytis (incluso las cepas resistentes a otros fungicidas).

Recomendaciones de Uso

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS (L/Ha)	PERIODO DE CARENIA (P.C.)	PERIODO DE REINGRESO (P.R.)
Statice, Clavel, Crisantemo, Rosas	Botrytis o Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 – 1.5 litros/ha, o 100 – 150 cc/100 litros de agua	N.A.	4 Horas
Tomate	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.8 – 1.0 litros/ha, o 200 – 300 cc/caneca de 200 litros	3 Días	4 Horas
Papa	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.4 – 0.5 litros/ha, o 100 – 150 cc/caneca de 200 litros	7 Días	4 Horas
Cebolla	Amarillera (<i>Alternaria porri</i>)	0.7 – 1.0 litros/ha, o 200 – 300 cc/caneca de 200 litros	7 Días	4 Horas

P.C.: PERIODO DE CARENIA: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: PERIODO DE REENTRADA: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. Una vez la superficie foliar está seca.





Frecuencia y época de aplicación

En general, con primeros síntomas de la enfermedad utilizar la dosis más baja del producto y con una presencia fuerte de la misma, utilizar la dosis más alta.

En flores, se debe utilizar un volumen de 1000 litros de agua por hectárea. Bajo condiciones de ataques graves, debido a su alta persistencia, protege las plantas durante 2 a 3 semanas cuando se usan las dosis recomendadas. Por lo tanto, las aspersiones deben repetirse a estos intervalos o cuando las condiciones sean favorables para una nueva infección.

En los cultivos de papa y hortalizas, se recomienda ajustar al volumen de agua aplicado.

Equipos y volumen de mezcla

Utilice los equipos, vías y volumen de aplicación comúnmente utilizados en la zona. Se debe tener en cuenta que los equipos de aplicación deben estar limpios antes y después de las aplicaciones, al igual que perfectamente calibrados para que permitan una buena aspersión que garantice el óptimo desempeño de **TORIN® 500 SC**, sobre el cultivo a tratar.

Compatibilidad y fitotoxicidad

TORIN® 500 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas químicos, a excepción de los productos altamente alcalinos (los cuales aceleran la degradación del iprodione). Evitar bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes. Cuando se requieran mezclas de **TORIN® 500 SC** con otros plaguicidas, se debe hacer pruebas preliminares de compatibilidad. No es fitotóxico si se utiliza siguiendo todas las recomendaciones de esta etiqueta.

Información sobre responsabilidad civil

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

Categoría toxicológica

